

Cerambycidae de Haute-Normandie

Bilan des années 2012 et 2013 et additif à l'année 2011 (Coleoptera)

Michel SAUVAGERE
2 l'Orée des Bois 27400 Le Mesnil-Jourdain
midom@cegetel.net

Nous avons déjà publié dans les deux premiers numéros de « l'Entomologiste Haut-Normand » le bilan des observations des Cerambycidae de Haute-Normandie depuis 2009. Voici la liste des données des longicornes de notre région pour les années 2012 et 2013 ainsi qu'un additif pour 2011. Ces nouvelles observations permettront de compléter le catalogue des Cerambycidae de Haute-Normandie paru en 2008 dans le dernier bulletin de l'AEE.

1. LISTE DES OBSERVATIONS 2012

1.1 Prioninae

-Prionus coriarius (L., 1758)

76 : Canteleu forêt de Roumare 31-VII (ML) ; La Mailleraye-sur-Seine, forêt de Brotonne 23-VIII (AS).

-Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)

27 : Vatteville 01-VII (MA).

1.2 Lepturinae

-Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

27 : Acquigny 12-V (MS) ; Louviers, forêt de Louviers 24-V (MS) ; Martot, forêt de Bord 14-V (MS)
76 : Rosay, forêt d'Eawy 18-III (ASEIHN).

-Rhagium bifasciatum (F., 1775)

76 : Forges-les-Eaux 29-V (ML).

-Stenocorus meridianus (L., 1758)

27 : Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG) ; Tourneville 29-V (AS).

-Dinoptera collaris (L., 1758)

27 : Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG).

-Cortodera humeralis (Schaller, 1783)

27 : Fontaine-sous-Jouy 23-V (MS) ; Heudreville-sur-Eure 23-V (MS).

-Grammoptera ruficornis (F., 1781)

27 : Bernières-sur-Seine 02-V (MS) ; Bouafles 02-V (MS) ; Courcelles-sur-Seine 31-V (AS) ; Ezy-sur-Eure 16-V (MS) ; Fatouville-Grestain 02-VI (PT) ; Fontaine-sous-Jouy 23-V (JLG) ; Heudreville-sur-Eure 10-V (MS) 12-V (JLG) ; Le Mesnil-Jourdain 14-VI (MS) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (MS) ; Saint-Aquilin-de-Pacy 16-V

(MS) ; Saint-Léger-de-Rôtes 30-V (JLG) ; Tourneville 29-V (AS).

76 : Elbeuf-sur-Andelle 27-VI (AS) ; Fesques 11-VI (AS) ; Lisors 09-V (MS) ; Rosay, forêt d'Eawy 13-VI (MS).

-Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)

27 : Andé 09-VI (JLG) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG, MS)
76 : Montigny 25-VI (AS).

-Pseudovadonia livida (F., 1776)

27 : Acquigny 02-VII (MS) ; Courcelles-sur-Seine 31-V (AS) ; La Haye-Malherbe 20-VI et 01-VIII (AS) ; Le Mesnil-Jourdain 20-VI (AS), 22-VI (MS).
76 : Hénouville 02-VII (AS) ; Sahurs 02-VII (AS & ML).

-Anoplodera sexguttata (F., 1775)

27 : Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG, MS).
76 : Heurteauville 19-VI (JBA).

-Stictoleptura scutellata (F., 1781)

27 : Incarville, forêt de Louviers 27-VI (PS).
76 : Rosay, forêt d'Eawy 13-VI (JLG, MS).

-Stictoleptura rubra (L., 1758)

27 : Hauville 25-VI (AS) ; Tourneville 09-VIII (AS).
76 : Heurteauville 06-VIII (BD) ; Notre-Dame-de-Bliquetuit 10-V (SG).

-Stictoleptura fulva (Degeer, 1775)

27 : Acquigny 02-VII (MS) ; Fontaine-Heudebourg 16-VII (JLG) ; Hauville 01-VIII (AS) ; Houetteville 26-VII (JLG).
76 : Cléon 15-VII (PS).

-Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)

27 : Le Mesnil-Jourdain 09 et 14-VI (MS), 20-VI (AS) ;
Le Noyer-en-Ouche 30-V (MS & JLG) ; Sacquenville 29-V (AS).

76 : Heurteauville 12-VI (MD) ; Rosay forêt d'Eawy 13-VI (MS) ; Saint-Etienne-du-Rouvray 02-VI (AS) ;
Vatteville-la-Rue, forêt de Brotonne 27-VI (SG).

-Leptura aurulenta(F., 1792)

27 : Le Mesnil-Jourdain 14-VIII (MS) ; Port-Mort 26-VII (PS).

-Leptura quadrifasciata (L., 1758)

27 : Fatouville-Grestain 15-VIII (PT) ; Saint-Etienne-du-Vauvray 30-VII (PS).

76 : Heurteauville (JBA) ; Ponts-et-Marais 22-VIII (EM & AS).

-Rutpela maculata (Poda, 1761)

27 : Acquigny 02-VII (MS) ; Fatouville-Grestain 01-V (PT) ; Hauville 01-VIII (AS) ; Le Mesnil-Jourdain 14-VI (MS) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (MS) ; Tourneville 09-VIII (AS).

76 : Hénouville 02-VII (AS) ; Heurteauville 12-VI (MD) ; 19 et 30-VI (JBA) ; Montigny 29-VI (AS) ; Saint-Etienne-du-Rouvray, forêt du Rouvray 02-VI (CERCION) ; Varengeville-sur-Mer 22-VI (ASEIHN).

-Stenurella nigra (L., 1758)

27 : Tourneville 29-V (AS).

76 : Hénouville 02-VII (AS).

-Stenurella bifasciata (Müller, 1776)

27 : Heudreville-sur-Eure 16-VII (JLG).

76 : Belbeuf 15-VII (PS).

-Stenurella melanura (L., 1758)

27 : Fatouville-Grestain 02-VI (PT) ; Heudreville-sur-Eure 16-VII (JLG) ; Houetteville 26-VII (JLG) ; Le Mesnil-Jourdain 22-VI (MS) ; Pont-de-l'Arche, forêt de Bord 03-VIII (AS & ML) ; Sacquenville 29-V (AS) ; Tourneville 29-V (AS).

76 : Belbeuf 15-VII (PS) ; Hénouville 02-VII (AS) ; Heurteauville 06-VIII (BD) ; Montigny 25-VI et 30-VII(AS) ; Quevillon 25-VI (ML) ; Vatteville-la-Rue, forêt de Brotonne 27-VI (SG).

1.3 Aseminae

-Arhopalus rusticus (L., 1758) 76 : Morville-sur-Andelle 16-VIII (EM).

1.4 Cerambycinae

-Gracilia minuta (F., 1781)

27 : Fatouville-Grestain 01-V (PT).

-Stenopterus rufus (L., 1767)

76 : Hénouville 02-VII (AS) ; Sotteville-sous-le-Val 30-VI (PS).

-Obrium cantharinum (L., 1767)

27 : Hauville 26-VII (AS).

Cerambyx scopolii (Füesslins, 1775)

27: Heudreville-sur-Eure 23.V (MS) ; Sacquenville 29-V (AS).

76 : Notre-Dame-de-Bliquetuit 10-VI (SG).

-Aromia moschata (L., 1758)

76 : Caudebec-en-Caux 20-VIII (SG).

-Semanotus laurasii (Lucas, 1852)

27 : Ezy-sur-Eure 08-III (EM).

-Ropalopus femoratus (L., 1758)

27 : Heudreville-sur-Eure 23-V (MS).

-Pyrrhidium sanguineum (L., 1758)

27 : Acquigny 12-V (MS); Criquebeuf-sur-Seine, forêt de Bord 14-V (MS) ; Fatouville-Grestain 14-V (JG) ; Hauville 08-IX (AS) ; Louviers, forêt de Louviers 14-V (MS) ; Martot, forêt de Bord 14-V (MS).

-Phymatodes testaceus (L., 1758)

27 : Hauville 25-VI (AS).

76 : Heurteauville 30-VI (JBA).

-Clytus arietis (L., 1758)

27: Chambray 23-V (MS) ; Criquebeuf-sur-Seine, forêt de Bord 14-V (MS) ; Fatouville-Grestain 02-VI (PT) ; Grosley-sur-Risle 30-V (MS) ; Hauville 18-V (AS) ; Louviers, forêt de Louviers 14-V (MS) ; Marais-Vernier 26-V (AS) ; Martot ,forêt de Bord 14-V (MS) ; Le Mesnil-Jourdain 14-VI (MS) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG) ; Sacquenville 29-V (AS).

76 : Rosay, forêt d'Eawy 13-VI (MS) ; Saint-Etienne-du-Rouvray, forêt du Rouvray 02-VI (AS).

-Plagionotus arcuatus (L., 1758)

27: Criquebeuf-sur-Seine, forêt de Bord 14-V (MS) ; Hauville 25-VI (AS) ; Louviers, forêt de Louviers 14 et 24-V (MS).

-Anaglyptus mysticus (L., 1758)

27 : Acquigny 03-V (MS) ; Heudreville-sur-Eure 23-V (JLG) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG, MS) ; Saint-Aquilin-de-Pacy 16-V (MS) ; Tourneville 29-V (AS).

1.5 Lamiinae

-Pogonocherus hispidus (L., 1758)

27 : Fatouville-Grestain 10-IV (JG).

-Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
27 : Fatouville-Grestain 10-IV (JG).

-Anaesthetis testacea (F., 1781)
27 : Fatouville-Grestain 01-VIII (JG).

-Leiopus nebulosus (L., 1758)
27 : Fatouville-Grestain 01-V (PT).

-Leiopus femoratus (Faimaire, 1859)
27 : Fontaine-sous-Jouy 23-V (MS) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG) ; Saint-Aquilin-de-Pacy 16-V (MS)
76 : Montigny 25-VI (AS).

-Saperda populnea (L., 1758)
27 : Vascoeuil 01-VI (EM).
76 : Heurteauville 06-VIII (BD).

-Oberea oculata (L., 1758)
76 : Morville-sur-Andelle 02-IX (EM) ; Tourville-la-Rivière 26-VII (JT).

-Agapanthia cardui (L., 1767)
27 : Saint-Léger-de-Rôtes 30-V (JLG).

-Agapanthia villosoviridescens (Degeer, 1775)
27 : Heudreville-sur-Eure 12-V (JLG) ; Saint-Léger-de-Rôtes 30-V (MS) ; Saint-Vigor 21-VI (AS) ; Tourneville 20-VI (AS).
76 : Caudebec-en-Caux 18-VI (SG) ; Elbeuf-sur-Andelle 27-VI (AS) ; Heurteauville 06-VIII (BD).

-Calamobius filum (Rossi, 1790)
27 : Andé 09-VI (JLG).

-Opsilia coeruleascens (Scopoli, 1763)
27 : Andé 09-VI (JLG).

-Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
27 : Fontaine-sous-Jouy 23-V (JLG & MS).

-Tetrops praeusta (L., 1758)
27 : Fatouville-Grestain 14-V (JG) ; Fontaine-sous-Jouy 23-V (JLG) ; Heudreville-sur-Eure 12 et 23-V (JLG) ; Le Noyer-en-Ouche 30-V (JLG).

2. LISTE DES OBSERVATIONS 2013

2.1 Lepturinae

-Rhagium inquisitor (L., 1758)
27 : Les Damps, forêt de Bord 27-V (DA).
76 : Forges-les-Eaux 07-VI (BD) ; Le Tilleul 01-VII (DG).

-Rhagium mordax (Degeer, 1775)
76 : Ponts-et-Marais 28-V (EM).

-Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775
76 : Vatteville-la-Rue 27-V (JG).

-Stenocorus meridianus (L., 1758)
27 : Heudreville-sur-Eure 04-VI (AS) 76 : Forges-les-Eaux 30-VI (BD).

-Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
27 : Ecos 05-V (EM) ; Tourneville 21-V (AS).

-Grammoptera ruficornis (F., 1781)
76 : Forges-les-Eaux 30-VI (JG) ; Heurteauville 18-V (AS) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM) ; Saint-Laurent-de-Brèvedent 08-VI (JBA).

-Alosterna tabacicolor (Degeer, 1775)
76 : Forges-les-Eaux 30-VI (EM).

-Pseudovadonia livida (F., 1776)
27 : Canappeville 27-VI (AS) ; Champ-Dolent 26-VI (AS) ; Gouville 26-VI (ML) ; Heudreville-sur-Eure 04-VI et 10-VII (AS), 20-VII (JLG) ; Le Mesnil-Jourdain 06 et 23-VII (MS), 13-VII (JLG), 18-VII (AS) ; Les Ventes 10-VII (AS & JLC).
76 : Haudricourt 29-VI (JG) ; Ponts-et-Marais 08-VIII (EM) ; Saint-Martin-au-Bosc 28-VI (ASEIHN).

-Anoplodera sexguttata (F., 1775)
27 : Hécourt 07-VII (SG).
76 : Quevillon 21-VI (EM).

-Stictoleptura scutellata (F., 1781)
27 : Courcelles-sur-Seine 27-VI (EM) ; forêt d'Evreux 09-VII (JG).

-Stictoleptura rubra (L., 1758)
27 : Francheville 31-VII et 02-VIII (JLC).
76 : Canteleu, forêt de Roumare 01-VIII (LP) ; Forges-les-Eaux 09 et 28-VIII (BD) ; Jumièges 01-VIII (LP) ; Le Tilleul 08-VIII (DG).

-Stictoleptura fulva (Degeer, 1775)
27 : Hauville 06-VII (AS) ; Heudreville-sur-Eure 05-VII (AS) ; Sainte-Opportune-la-Mare 01-VII (PNRBSN).
76 : Belbeuf 06-VII (JG) ; Canteleu, forêt de Roumare 01-VIII (LP) ; Criquetot-l'Esneval 16-VII (DG) ; Ellecourt 08-VII (AS & JLC) ; Hénouville 23-VII (MS) ; Ponts-et-Marais 08-VIII (EM) ; Vieux-Rouen-sur-Bresle 17-VII (AS & JLC).

-Anastrangalia sanguinolenta (L., 1761)
27 : Huest 01-VII (EM).

-*Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763)

27 : Vesly 02-VII (EM).

-*Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781)

27 : Le Mesnil-Jourdain 26-VI (MS) ; Tourneville 26-VI (AS).

76 : Forges-les-Eaux 30-VI (EM) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM) ; Saint-Laurent-de-Brèvedent 08-VI (JBA).

-*Leptura aurulenta* (F., 1792)

27 : Francheville 03-VIII (JLC) ; Touffreville 02-IX (EM).

76 : Forges-les-Eaux 30-VI (EM), 31-VII (MS) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM).

-*Leptura quadrifasciata* (L., 1758)

27 : Francheville 31-VII (JLC) ; Sainte-Opportune-la-Mare 15-VII (PNRBSN).

76 : Forges-les-Eaux 30-VI (EM) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM) ; Le Trait, forêt du Trait-Maulévrier 23-VII (MS).

-*Rutpela maculata* (Poda, 1761)

27 : Cierrey 16-VII (ML) ; Les Damps, forêt de Bord 06-VIII (ML) ; Heudreville-sur-Eure 10-VII (AS), 20-VII (JLG) ; Le Mesnil-Jourdain 06-VII (MS) ; Port-Mort 09-VII (ML) ; Reuilly 10-VII (ML) ; Tourneville 18-VII (AS).

76 : Canteleu forêt de Roumare 01-VIII(LP) ; Hénouville 01-VII (AS) ; Jumièges 01-VIII (LP) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM) ; La Poterie-Cap-d'Entifer 02-VII (DG) ; Sandouville 26-VI (JBA) ; Le Trait forêt du Trait-Maulévrier 23-VII (MS) ; Vieux-Rouen-sur-Bresle 17-VI (AS & JLC).

-*Stenurella nigra* (L., 1758)

27 : La Roquette 01-VI (JLG).

76 : Belbeuf 14-VII (LP) ; Hénouville 01-VII (AS) ; Ponts-et-Marais 08-VIII (EM).

-*Stenurella bifasciata* (Müller, 1776)

27 : Heudreville-sur-Eure 06 et 20-VII (JLG).

76 : Belbeuf 06-VII (JG) ; Forges-les-Eaux 28-VIII (BD) ; Hénouville 1-VII (AS).

-*Stenurella melanura* (L., 1758)

27 : Heudreville-sur-Eure 20-VII (JLG) ; Le Mesnil-Jourdain 06-VII (MS), 18-VII (AS) ; Tourneville 18-VII (AS).

76 : Belbeuf 06-VII (JBA & JG) ; Bénarville 25-VI (JBA) ; Forges-les-Eaux 28-VIII (BD) ; Hénouville 01-VII (AS) ;

Saint-Martin-au-Bosc 28-VI (ASEIHN) ; Le Trait, forêt du Trait-Maulévrier 23-VII (MS).

2.2 Spondyliinae

-*Arhopalus rusticus* (L., 1758)

76 : Forges-les-Eaux 09-VIII (BD) ; Morville-sur-Andelle 05-VIII (EM).

-*Tetropium castaneum* (L., 1758)

27 : Le Boulay-Morin 26-VI (EM).

2.3 Cerambycinae

-*Stenopterus rufus* (L., 1767)

27 : Gouville 26-VI (ML) ; Les Ventes 10-VII (AS & JLC).

76 : Ellecourt 08-VII (AS & JLC) ; Forges-les-Eaux 09 et 28-VIII (BD) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM).

-*Cerambyx scopolii* (Füesslins, 1775)

27 : Le Boulay-Morin 01-VII (EM) ; Heudreville-sur-Eure 11-VI (JLG) ; Sainte-Geneviève-les-Gasny 25-V (EM), 10-VI (LP).

-*Aromia moschata* (L., 1758)

76 : Ponts-et-Marais 25-VII (CA & EV).

-*Hylotrupes bajulus* (L., 1758)

76 : Forges-les-Eaux 09 et 28-VIII (BD).

-*Pyrrhidium sanguineum* (L., 1758)

27 : Hauville 20-IV et 21-V (AS) ; Sacquenville 21-V (AS).

76 : Criquières 07-V (JBA) ; Ponts-et-Marais 08-VIII (EM).

-*Phymatodes testaceus* (L., 1758)

76 : Caudebec-en-Caux 01-VII (JG) ; Criquetot-l'Esneval 10-VII (DG) ; Oissel 25-VI (ML) ; Saint-Jean-de-Folleville 14-VII (AS).

-*Clytus arietis* (L., 1758)

27 : Le Boulay-Morin 26-VI (EM) ; Francheville 01-VIII (JLC) ; Le Mesnil-Jourdain 29-V (MS) ; Normanville 01-VII (ML & EM) ; Poses 27-V (DA) ; Sainte-Geneviève-les-Gasny 10-VI (EM) ; Sainte-Opportune-la-Mare 01-VII (PNRBSN) ; Saint-Laurent-du-Tencement 09-VI (PS).

76 : Caudebec-en-Caux 19-VI (JG) ; Criquetot-l'Esneval 01-VII (DG) ; Ferrières-en-Bray 11-VI (EM) ; Forges-les-Eaux 30-VI (EM & MS) ; Heurteauville 05 et 18-V (AS) ; La Mailleraye-sur-Seine, forêt de Brotonne 06-

VI (AS & JLC) ; Oissel 17-V (ML) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM) ; Le Tilleul 01-VII (DG).

-*Plagionotus arcuatus* (L., 1758)

76 : Saint-Laurent-de-Brèvedent 08-VI (JBA).

-*Anaglyptus mysticus* (L., 1758)

76 : Ferrières-en-Bray 11-VI (EM) ; Mauquenchy 15-VI (BD) ; Saint-Léger-du-Bourg-Denis 22-V (EM).

2.4 Lamiinae

-*Mesosa nebulosa* (F., 1781)

27 : Pressagny-l'Orgueilleux 25-IV (AS) ; Vascoeuil 14-VI (EM) 76 : Belbeuf 19-VI (EM) ; Heurteauville 05-V (JBA) ; Vatteville-la-Rue, forêt de Brotonne 03-I (JG)

-*Lamia textor* (L., 1758)

27 : Romilly-sur-Andelle 11-X (JC).
76 : Déville-lès-Rouen 18-X (JC) ; Ponts-et-Marais 30-VIII (EM).

-*Pogonocherus hispidus* (L., 1758)

76 : Forges-les-Eaux 02-V (JLG) ; Heurteauville 05-V (JBA).

-*Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758)

76 : Vatteville-la-Rue 15-VI (JG).

-*Leiopus femoratus* (Fairmaire, 1859)

76 : Forges-les-Eaux 30-VI (MS) ; Ponts-et-Marais 28-V (EM) ; Le Trait, forêt du Trait-Maulévrier 23-V (MS).

-*Saperda carcharias* (L., 1758)

27 : Francheville 03-VIII (JLC).

-*Saperda scalaris* (L., 1758)

76 : Ponts-et-Marais 04-VII (EM).

-*Saperda populnea* (L., 1758)

76 : Forges-les-Eaux 30-VI (JG & EM).

-*Oberea linearis* (L., 1761)

27 : Bernouville (EM).

-*Agapanthia violacea* (F., 1775)

27 : Pinterville 02-VII (JLG) ; Sainte-Geneviève-les-Gasny 08-VIII (EM).

-*Agapanthia cardui* (L., 1767)

76 : Benarville 25-VI (JBA) ; Tancarville 03-VII (JBA).

-*Agapanthia villosoviridescens* (Degeer, 1775)

27 : Saint-Etienne-du-Vauvray 01-VI (PS).

76 : Elbeuf-sur-Andelle 26-VII (EM) ; Nesle-Normandeuse 29-VI (SG & EM) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM).

-*Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)

27 : Sainte-Geneviève-les-Gasny 10-VI (EM).

-*Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763)

76 : Belbeuf 06-VII (JBA) ; Orival 06-VII (JBA).

-*Phytoecia cylindrica* (L., 1758)

27 : Vascoeuil 14-VI (EM).

76 : Criquiers 07-V (JBA).

-*Tetrops praeusta* (L., 1758)

76 : Caudebec-les-Elbeuf 26-V (DA) ; Nesle-Normandeuse 29-VI (JG) ; Ponts-et-Marais 04-VII (EM) ; Saint-Laurent-de-Brèvedent 08-VI (JBA).

3. ADDITIF A L'ANNEE 2011

Quelques données tardives me sont parvenues après la parution de l'article «Cerambycidae de Haute-Normandie, bilan de l'année 2011 » paru dans le numéro 2de notre revue. Aux 49 espèces déjà citées, il convient d'en ajouter 3 autres :

-*Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839), capturée au piège (tente Malaise) le 30-V par Pierre TRIPOTIN à Courcelles-sur-Seine (Eure). C'est une capture particulièrement intéressante puisque cette espèce, considérée comme disparue de notre région, n'avait été signalée en Haute-Normandie qu'à six reprises, toutes avant 1938, dans les ouvrages d'A. SIMON (Catalogue systématique des Cerambycidae de l'Eure) et de R. DUPREZ (Catalogue des Coléoptères des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure).

-*Molorchus minor* (Linnaeus, 1758), également capturée dans une tente Malaise le 30-V par P. TRIPOTIN à Courcelles-sur-Seine.

-*Agapanthia violacea* (F., 1775), observée par J.L. GARGATTE à Heudreville-sur-Eure (Eure) le 21-V.

Voici les localités nouvelles concernant 10 espèces déjà citées dans le bilan de l'année 2011 :

-*Grammoptera ruficornis* (F., 1781) : Les Andelys (27) 27-IV (JLG) ; Cléon (76) 11-V (JLG).

-*Alosterna tabacicolor* (Degeer, 1775) : Cailly-sur-Eure (27) 04-V (JLG).

-*Stenurella nigra* (L., 1758) : Cailly-sur-Eure (27) 04-V (JLG).

-*Stenurella melanura* (L., 1758) : Heudreville-sur-Eure (27) 25-VII (JLG) ; Mésangueville (76) 15-VI (AS).

-*Clytus arietis* (L., 1758) : Chambray (27) 19-V (JLG).

-*Anaglyptus mysticus* (L., 1758) : Chambray (27) 18-V (JLG).

-*Agapanthia cardui* (L., 1767) : Jouy-sur-Eure (27) 19-V (JLG) ; Lorleau (27) 14-V (JLG).

-*Agapanthia villosiviridescens* (Degeer, 1775) : Jouy-sur-Eure (27) 19-V (JLG) ; Le Tilleul (76) 25-V (DG).

-*Calamobius filum* (Rossi, 1790) : Cailly-sur-Eure (27) 04-V (JLG) ; Jouy-sur-Eure (27) 19-V (JLG) ; Cléon (76) 14-V (PS).

-*Tetrops praeusta* (L., 1758) : Cailly-sur-Eure (27) 04-V (JLG) ; Fontaine-Heudebourg (27) 25-IV (JLG) ; Tourville-la-Rivière (76) 21-IV (PS).

4. COMMENTAIRES (ANNEES 2012 et 2013)

Comme le montre le tableau ci-dessous 2012 a été une année comparable aux trois précédentes. 47 espèces ont été observées en Haute-Normandie (41 dans l'Eure et 26 en Seine-Maritime), soit 41% des 115 espèces recensées dans notre région.

Trois espèces ont été redécouvertes, *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) et *Gracilia minuta* (F., 1781) qui n'avaient plus été observées depuis plus de 70 ans. Mais surtout la capture d'*Obrium cantharinum* (L., 1767) à Hauville par Adrien SIMON est remarquable puisque cette espèce n'avait jusqu'alors été signalée qu'une seule fois à Evreux avant 1938 (Catalogue d'André SIMON).

En 2013, les conditions météorologiques très mauvaises du printemps n'ont, semble-t-il, pas eu de répercussions sur le nombre d'espèces observées : 48. On a simplement constaté que de nombreuses espèces habituellement actives en mai et juin, sont sorties plus tardivement en juillet et août. Par contre le nombre d'espèces observées dans l'Eure (29 seulement) est le plus faible de ces 5 dernières années. Paradoxalement le score réalisé en Seine-Maritime (38) est le meilleur. Une nouvelle espèce pour la Haute-Normandie, *Anastrangalia sanguinolenta* (L., 1761) a été découverte dans l'Eure à Huest par E. MACE. Une autre espèce, *Tetropium castaneum* (L., 1758) a été redécouverte, également par E. MACE, au Boulay-Morin (Eure) ; l'observation précédente datait de 1966 (Grand-Couronne par M. TOUZEAU).

	2009			2010			2011			2012			2013		
	HN	E	SM												
Prioninae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Lepturinae	20	18	15	19	13	17	18	17	10	19	18	15	21	17	17
Spondylinae	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1
Aseminae	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Cerambycinae	13	11	9	14	11	8	15	15	5	12	10	5	9	4	8
Lamiinae	11	10	6	13	12	7	18	16	10	13	12	4	16	8	12
Totaux	46	40	31	48	36	34	52	49	25	47	41	26	48	29	38

Répartition du nombre d'espèces: HN (Haute-Normandie) E (Eure); SM (Seine-Maritime)

Remarques sur les observations de 2012 :

Non observé depuis 2009, *Prionus coriarius* (L., 1758) a été capturé cette année à deux reprises dans les forêts de Roumare (M. LORTHIOIS) et de Brotonne (A.SIMON). C'est une espèce nocturne et crépusculaire assez rarement observée en Haute-Normandie.

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) : seulement trois citations anciennes concernaient cette espèce. En 2011, à Vatteville (Eure), Michel AMAT, lors du débroussaillage d'un chemin de Grande Randonnée, a récolté dans une souche de *Prunus*

malheb, des larves dont l'élevage a donné cette année trois imagos (deux mâles et une femelle). C'est donc une redécouverte exceptionnelle de cette espèce nocturne pour notre région.

Stenocorus meridianus (L., 1758) est assez régulièrement observé chaque année, mais jamais en grand nombre. Il a été capturé dans l'Eure à deux reprises en 2012.

Dinoptera collaris (L., 1758) en 2012 au Noyer-en-Ouche (Eure) par JL. GARGATTE. Cette espèce est

peu fréquente en Haute-Normandie (observation précédente en 2008).

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) : peu d'observations au cours des dix dernières années (deux en 2012, dans l'Eure).

Anoplodera sexguttata (F., 1775) et **Stictoleptura scutellata** (F., 1781) sont régulièrement observées en petit nombre depuis 2006 (deux observations cette année pour chacune de ces deux espèces).

Arhopalus rusticus (L., 1758) a été capturé en chasse de nuit à Morville-sur-Andelle (76) par E. MACE. Les observations précédentes dataient de 2009.

Gracilia minuta (F., 1781) est l'une des redécouvertes remarquables de l'année. P. TRIPOTIN en a capturé un couple dans un piège (tente Malaise) à Fatouville-Grestain (Eure) La littérature ne mentionnait que cinq citations très anciennes de cette espèce en Haute-Normandie.

Obrium cantharinum (L., 1767) a été redécouvert à Hauville (voir ci-dessus).

Aromia moschata (L., 1758) est régulièrement observé depuis 2006, mais jamais en grand nombre. Une observation a été réalisée cette année par S. GAUDET à Caudebec-en-Caux.

Autrefois régulièrement récolté dans la vallée de l'Eure par André SIMON, **Semanothus laurasii** (Lucas, 1852) inféodé aux genévriers, a été trouvé cette année par E. MACE à Ezy-sur-Eure. C'est seulement la troisième observation depuis 1952 après celle de J.F. ELDER à Giverny en 2005 et celle de G. HAZET à Chambray en 1985 (*cf premier article de ce numéro*).

Après les observations de 2010 et 2011, la capture de **Ropalopus femoratus** (L., 1758) à Heudreville-sur-Eure par M. SAUVAGERE confirme le renouveau de cette espèce dans l'Eure.

J. GRANCHER a récolté un exemplaire de **Pogonocherus hispidulus** (Piller & Mitterpacher, 1783) à Fatouville-Grestain. C'est une espèce rarement observée en Haute-Normandie. Elle n'avait été signalée qu'à quatre reprises pendant les soixante dernières années, la dernière fois en 2005.

Une nouvelle station, Fatouville-Grestain, a été découverte par J. GRANCHER pour **Anaesthetis testacea** (F., 1781).

Saperda populnea (L., 1758) a été observée à deux reprises en 2012. Ce sont les cinquième et sixième observations de cette espèce en Haute-Normandie au cours des vingt-cinq dernières années.

Oberea oculata (L., 1758) a été capturée deux fois cette année. C'est une espèce peu commune, mais

observée à peu près régulièrement au cours de ces dix dernières années.

Agapanthia cardui (L., 1767) n'a été observée qu'une seule fois en 2012 alors qu'elle était assez abondante au cours des années précédentes.

La capture de **Stenostola dubia** (Laicharting, 1784) à Fontaine-sous-Jouy (Eure) par J.L. GARGATTE est remarquable puisque c'est seulement la troisième observation de cette espèce en Haute-Normandie après celles de T. TASSEL à Duclair en 1981 et de M. TOUZEAU en Forêt Verte en 1965.

Remarques sur les observations de 2013 :

Rhagium mordax (Degeer, 1775) : une seule donnée en 2013 de cette espèce peu souvent observée dans notre région.

Stenocorus meridianus (L., 1758) et **Cortodera humeralis** (Schaller, 1783) ont été observées seulement deux fois en 2013, comme en 2012.

Anoplodera sexguttata (F., 1775) et **Stictoleptura scutellata** (F., 1781) : une seule observation pour chacune de ces deux espèces en 2013.

Anastrangalia sanguinolenta (L., 1761) : nouvelle espèce pour la Haute-Normandie (voir ci-dessus). **Anastrangalia dubia** (Scopoli, 1763) : trouvée à Vesly dans l'Eure par E. MACE, c'est seulement la quatrième observation de cette espèce découverte en Haute-Normandie en 2004.

Tetropium castaneum (L., 1758) : non observée depuis 1966, cette espèce a été redécouverte cette année (voir ci-dessus).

Aromia moschata (L., 1758) : une seule observation pour cette espèce, comme en 2012.

Hylotrupes bajulus (L., 1758) n'avait pas été observée depuis 2001 ; cette espèce a été prise cette année à deux reprises à Forges-les-Eaux par B. DARDENNE et J.B. AUBOURG.

Lamia textor (L., 1758) n'avait été observée que deux fois depuis 1970. Cette année cette espèce a été récoltée à trois reprises, à Déville-lès-Rouen (J. CHARBONNIER) et à Ponts-et-Marais (E. MACE) en Seine-Maritime ainsi qu'à Romilly-sur-Andelle (J. CHARBONNIER) dans l'Eure.

Quelques rares Saperdes ont été observées en 2013 : **Saperda carcharias** (L., 1758) à Francheville (Eure) par J. CHARBONNIER ; **Saperda scalaris** (L., 1758) à Ponts-et-Marais (Seine-Maritime) par E. MACE ; **Saperda populnea** (L., 1758), moins rare que les précédentes, à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) par J. GRANCHER et E. MACE.

Oberea linearis (L., 1761) : l'exemplaire trouvé à Bernouville (Seine-Maritime) par E. MACE n'est que la troisième observation de ces 25 dernières années.

Agapanthia violacea (F., 1775) peu fréquente en Haute-Normandie, a été prise dans l'Eure à Pinterville par J.L. GARGATTE et à Sainte-Geneviève-les-Gasny par E. MACE.

La capture de ***Stenola dubia*** (Laicharting, 1784) à Sainte-Geneviève-les-Gasny par E. MACE, confirme sa présence dans l'Eure après l'observation de 2012 à Fontaine-sous-Jouy

Phytoecia cylindrica (L., 1758), rare en Haute-Normandie, a été observée à Criquiers (Seine-Maritime) par JB. AUBOURG et à Vascoeuil (Eure) par E. MACE.

4. LISTE DES CONTRIBUTEURS

Michel AMAT (MA) ; C. ARCHERAY (CA) ; Association Entomologique De Haute Normandie (ASEHN) ; Jean-Bernard AUBOURG (JBA) ; Daniel AUBRY (DA) ; Jeanne CHARBONNIER (JC) ; Jean-Loup CHARPENTIER (JLC) ; Collectif d'Etude Régionale pour la Cartographie et l'Inventaire des Odonates de Normandie (CERCION) ; Bernard DARDENNE (BD) ; Marie DARDENNE (MD) ; Jean-Louis GARGATTE (JLG) ; Simon GAUDET (SG) ; Jacques GRANCHER (JG) ; David GUEDON (DG) ; Matthieu LORTHIOIS (ML) ; Emmanuel MACE (EM) ; Laurent PALUSSIÈRE (LP) ; Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN) ; Michel SAUVAGÈRE (MS) ; Adrien SIMON (AS) ; Patrice STALLIN (PS) ; Jérôme TABOUELLE (JT) ; Pierre TRIPOTIN (PT) ; Emmanuel VOCHÉLET (EV)

Mes remerciements les plus chaleureux vont à tous mes collègues qui m'ont transmis leurs observations et sans qui le présent article n'aurait pu être rédigé.

Bibliographie

BERGER P. 2012.- Coléoptères cerambycidae de la faune de France continentale et de Corse. Actualisation de l'ouvrage d'André Villiers, 1978. *Supplément au Tome XXI - R.A.R.E.* Janvier 2012. 664p.

DODELIN C. & SAUVAGÈRE M., 2009.- Catalogue des Cerambycidae de Haute-Normandie. *Bulletin de*

l'Association Entomologique d'Evreux N°57-58. janvier-juillet 2006. 35p

GOUVERNEUR X. & GUERARD P., 2011.- Les longicornes armoricains - Atlas des Coléoptères cerambycidae des départements du Massif armoricain. *Invertébrés armoricains, les Cahiers du GRETIA*, 7. 224p.

SAUVAGÈRE M. 2011.- Additif au Catalogue des Cerambycidae de Haute-Normandie. *L'Entomologiste Haut-Normand, Revue de l'Association Entomologique et Invertébriste de Haute-Normandie* N°1 année 2011. 6p.

SAUVAGÈRE M. 2012.- Cerambycidae de Haute-Normandie. Bilan de l'année 2011. *L'Entomologiste Haut-Normand, Revue de l'Association Entomologique et Invertébriste de Haute-Normandie* N°2 année 2012 4p.